



## BELLAPAN

POSTAĆ I SKŁAD	Tabletki, 1 tabletkę zawiera zespół alkaloidów tropanowych w przeliczeniu na atropiny siarczan – 0,25 mg. (Atropini sulfas)
WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA	Stany skurczowe w obrębie: przewodu pokarmowego (kolka żołądkowa, jelitowa), dróg moczowych, dróg żółciowych. Stany, w których konieczne jest zmniejszenie wydzielania śliny i wydzieliny oskrzelowej.
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA	Dorośli: 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę. Podanie doustne, popijając wodą. Bellapan można przyjmować niezależnie od posiłku. Produktu leczniczego Bellapan nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
PRZECIWSKAZANIA	Nadwrażliwość na atropinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, dekstryna, talk, magnezu stearynian), jaskra, astma oskrzelowa, rozrost gruczołu krokowego, zatrzymanie moczu, tachykardia, niewydolność krążenia, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zwężenie odźwiernika, ciąża, karmienie piersią.
SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA	Długotrwałe podawanie produktu leczniczego Bellapan wywołuje wysuszenie błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia akomodacji. U mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego może nasilać dolegliwości związane z trudnościami w oddawaniu moczu. Bellapan może powodować reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki na skórze. Lek (ze względu na obecność laktozy) nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy – galaktozy.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE	Niekiedy występują: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: suchość błon śluzowych i skóry, zaczerwienienie skóry, zaburzenia żołądka i jelit: zaparcia, zaburzenia okulistyczne: akomodacji, porażenie zwieraczy źrenicy, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, zaburzenia psychiczne: pobudzenie lub depresja w zależności od dawki, omamy wzrokowe.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY	Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o., ul. Św. Wojciech 29, 61-749 Poznań, tel. +48 61 852 63 53, e-mail: info@farmapol.pl
KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI I POZWOLENIE	Produkt leczniczy Rp nr R/2631