



## ZINCAS®

|   |   |
|---|---|
| POSTAĆ I SKŁAD  | Tabletki, 1 tabletkę zawiera 5,5 mg jonów cynku w postaci 31 mg cynku wodorooasparaginianu dwuwodnego (Zinci hydroaspartas)   |
| WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA                                       | Niedobór cynku.   |
| DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA                                   | Dzieci w wieku do 5 lat: 1 tabletkę 1 raz na dobę, od 5 do 15 lat: 1 tabletkę 2 razy na dobę. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat: 1 tabletkę 3 razy na dobę. Podanie doustne. Zaleca się przyjmowanie po posiłku, popijając wodą. Małym dzieciom nie wolno podawać tabletek w całości.                   |
| PRZECIWWSKAZANIA  | Nadwrażliwość na cynku wodorooasparaginian dwuwodny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa typ C, celuloza mikrokrystaliczna, żółcień chinolinowa (E 104)). Nie należy stosować w niewydolności nerek.   |
| SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA | Produkt leczniczy podawany w dawce większej niż zalecana może działać przeczyszczająco. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. |
| DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE   | Nie zgłaszano przy zalecanym dawkowaniu. Większe dawki związków cynku mogą powodować wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, bóle brzucha, biegunka), metaliczny smak w ustach, ból głowy. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do niedoboru miedzi i niedokrwistości.                            |
| PODMIOT ODPOWIEDZIALNY  | Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.,<br>ul. Św. Wojciech 29, 61-749 Poznań, tel. +48 61 852 63 53, e-mail: info@farmapol.pl   |
| KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI I POZWOLENIE                              | Produkt leczniczy OTC<br>nr R/2636  |