

ASMAG® FORTE



POSTAĆ I SKŁAD	Tabletki, 1 tabletkę zawiera 34 mg jonów magnezu w postaci 500 mg magnezu wodorooasparaginianu czterowodnego (Magnesii hydroaspartas)
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Niedobór magnezu.
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA	Dorośli: 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę. Podanie doustne. Zaleca się przyjmowanie po posiłku, popijając wodą. Produktu leczniczego Asmag Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
PRZECIWWSKAZANIA	Nadwrażliwość na magnezu wodorooasparaginian czterowodny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa typ C, metylceluloza). Hipermagnezemia, ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), antybiotykoterapia, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok), bradykardia, myasthenia gravis, biegunka.
SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA	Produkt leczniczy podawany w dawce większej niż zalecana może działać przeczyszczająco. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE	Nie zgłaszano przy zalecanym dawkowaniu. Większe dawki związków magnezu mogą powodować wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, wymioty, biegunka).
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY	Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o., ul. Św. Wojciech 29, 61-749 Poznań, tel. +48 61 852 63 53, e-mail: info@farmapol.pl
KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI I POZWOLENIE	Produkt leczniczy OTC nr R/2630