



ZINCAS®

POSTAĆ I SKŁAD	Tabletki; 1 tabletkę zawiera 5,5 mg jonów cynku w postaci 31 mg cynku wodorooasparaginanu dwuwodnego (Zinci hydroaspartas).
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Niedobór cynku.
DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA	Dzieci w wieku do 5 lat: 1 tabletkę 1 raz na dobę, od 5 do 15 lat: 1 tabletkę 2 razy na dobę. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat: 1 tabletkę 3 razy na dobę. Podanie doustne. Zaleca się przyjmowanie po posiłku, popijając wodą. Małym dzieciom nie wolno podawać tabletek w całości.
PRZECIWWSKAZANIA	Nadwrażliwość na cynku wodorooasparaginan dwuwodny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa typ C, celuloza mikrokrystaliczna, żółcień chinolinowa (E 104)). Nie należy stosować w niewydolności nerek.
SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA	Produkt leczniczy podawany w dawce większej niż zalecana może działać przeczyszczająco. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE	Nie zgłaszano przy zalecanym dawkowaniu. Większe dawki związków cynku mogą powodować wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, bóle brzucha, biegunka), metaliczny smak w ustach, ból głowy. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do niedoboru miedzi i niedokrwistości.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o., ul. Święty Wojciech 29, 61-749 Poznań, tel. +48 61 852 63 53, e-mail: info@farmapol.pl
KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI	OTC - Lek wydawany bez recepty.
UPRAWNIONY ORGAN	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

